

## PLP 固定液

产品货号: R23094

产品规格: 100ml/500ml

### 产品简介:

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构，固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长。固定剂通过凝固、生成添加化合物等使蛋白质内部结构发生改变，从而使酶失活。固定剂对细胞核细胞外成分发生物理改变。未固定前活细胞被包裹在不能穿透的膜内，固定剂能够破坏这一屏障，使大分子物质穿透膜、逸出。选择固定液对组织染色和免疫组化染色都极其重要，通常将几种固定剂混合配制成为复合固定液，这样可以适应多种组织、细胞成分的保存，然而目前还没有一种标准的固定液适用于所有的组织、细胞成分的保存。固定液主要分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等，较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

PLP 固定液(PLP Fluid) 又称过碘酸钠-赖氨酸-多聚甲醛固定液，主要由过碘酸钠、赖氨酸、多聚甲醛等组成，多用于含糖类组织的固定，尤其适用于免疫电镜中保护抗原性和超微结构。

### 产品组成:

名称	规格	规格	保存条件
PLP固定液	100ml	500ml	4℃，避光

### 操作步骤(仅供参考):

- 按实验具体要求操作。
- 一般需固定6~18h。如果组织块大，可适当延长固定时间，但不宜超过24h。

### 注意事项:

- PLP Fluid 对人体有一定的损害，请在通风好的环境下小心操作，避免吸入。
- 组织取材的厚度不同，固定时间也不同，对组织恰当的选材有利于固定液的渗透。
- 固定液的容量应足够，一般固定液与组织块的体积比率应大于10:1。温度对固定的影响很明显，提高温度可以加速固定作用，但温度不宜过高。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 1个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com