

TAF固定液

产品货号: R23115

产品规格: 500ml

产品简介:

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构,固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长。固定剂通过凝固、生成添加化合物等使蛋白质内部结构发生改变,从而使酶失活。固定剂对细胞核细胞外成分发生物理改变。固定液主要分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等,较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

TAF固定液又称为三羟基乙胺福尔马林固定液,主要由甲醛、三羟基乙胺、去离子水组成,该固定液适合于 线虫的固定。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品内容:

试剂名称	规格	保存温度
TAF固定液	500ml	室温,避光

操作步骤(仅供参考):

- 1. 按实验具体要求操作,一般标本固定时间控制在1~4h/mm,大标本应适当延长固定时间。
- 2. 固定好的组织,可在TAF固定液或90%乙醇中长期保存。

注意事项:

- 1. TAF固定液一定刺激性和腐蚀性,请在通风较好的环境下小心操作,避免吸入。
- 组织取材的厚度不同,固定时间也不同;常规活检组织比较适合的厚度为2~4mm,一般不超过6mm,对组织恰当的选材有利于固定液的渗透。
- 3. 固定液的容量应足够,一般固定液与组织块的体积比率应大于10:1; 如果容积不够大可以在固定期间更换1~3 次固定液。
- 4. 温度对固定的影响很明显,提高温度可以加速固定作用,但温度不宜过高。
- 5. 取出新鲜组织后应及时固定,无法及时固定时应保存于生理盐水中及时送检。
- 6. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。